

Ультразвуковая доплерография нижней полой вены с висцеральными ветвями/УЗДГ/Допплер нижней полой вены с висцеральными ветвям/НПВ

Методика позволяет врачу:

- > изучить ход и расположение элементов венозного русла;
- > выявить нарушения проходимости сосудов в виде тромбов, зон сужения или окклюзии;
- > обнаружить аномалии сосудистого русла, имеющие врожденный характер;
- > оценить состояние региональной гемодинамики.

Подготовка к исследованию

За 3 дня для ультразвукового сканирования пациенту рекомендуется изменить рацион, исключив продукцию, вызывающую усиленное образование газов в кишечной полости:

- > кисломолочная продукция (в особенности – цельное молоко);
- > черный хлеб;
- > кондитерские изделия высококалорийного типа;
- > газированные и напитки (алкогольные и безалкогольные);
- > овощи в сыром виде;
- > растительная пища, входящая в категорию бобовых культур.

За 2 суток до диагностики назначают прием энтеросорбентов. Препарат выбора – активированный уголь, который дозируют с расчетом 1 таблетка (250 мг) на 10 кг веса пациента. Лекарственное средство необходимо принимать 3 раза в сутки через 60 минут после еды.

Если пациент на постоянной основе принимает медикаменты или УЗДГ будет проводиться в период лечения каким-либо препаратом, об этом следует сообщить врачу, чтобы получить соответствующие рекомендации. Также в день УЗИ нужно отказаться от курения.

Если пациент некогда проходил УЗДГ нижней полой вены и ее висцеральных ветвей, желательно взять на прием прошлые результаты.