

Ультразвуковое исследование мелких суставов СТОПЫ

Благодаря УЗИ суставов стопы могут быть обнаружены признаки ревматоидного поражения. Методика позволяет оценить состояние сухожилий, мышц и кровеносных сосудов.

Этот метод диагностики позволяет выявить даже незначительные повреждения суставных структур и окружающих тканей. Исследование может использоваться для дифференциальной диагностики, в случае, когда необходимо поставить точный диагноз и отличить обычное воспаление от ревматоидного.

При первичном исследовании обязательно осматривают парные суставы, поскольку существуют заболевания, при которых УЗИ парных суставов позволяет поставить точный диагноз и подобрать полноценное лечение. В связи с этим стоимость услуги следует увеличивать в два раза. Для оценивания динамики ранее определенного заболевания и контроля лечения, цена исследования остается неизменной, как указана в прайсе.

Подготовка к исследованию

Исследование не требует специальной подготовки. Пациент должен придерживаться обычного водного и пищевого режима. Индивидуальные рекомендации обозначит врач перед назначением исследования. На приеме специалист может скорректировать алгоритм проведения исследования.

Если ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей проводилась раньше, ее результаты следует взять с собой. Они необходимы, чтобы отследить динамику.