

Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты/УЗДГ/Допплер брюшного отдела аорты

Благодаря использованию этой диагностической методики врач может выявить признаки патологического процесса в сосудистой стенке аорты (выпячивание), и подобрать вариант лечения. Ультразвуковое исследование участка аорты, локализованного в брюшной полости, зачастую назначают после комплексного обследования органов пищеварительной системы. Показанием к нему становятся обнаруженные косвенные признаки, сигнализирующие о росте аневризмы.

Подготовка к исследованию

За 3 суток до диагностики проводится коррекция рациона. Пациент должен исключить из меню продукцию, провоцирующую усиленное образование газов:

- > овощи в сыром виде;
- > молоко;
- > растительная пища из группы бобовых культур;
- > газированные напитки;
- > черный хлеб и кондитерские изделия.

За 2 дня до ультразвукового исследования рекомендован прием энтеросорбентов. Наиболее распространенным вариантом признан активированный уголь, который пациент должен пить 3 раза в сутки. Время приема препарата – через 60 минут после еды. Дозировка угля рассчитывается по схеме 1 таблетка (250 мг) на 10 кг массы тела.

Если пациент на постоянной основе использует какие-либо медикаменты, об этом в обязательном порядке необходимо сообщить лечащему врачу. Доктор даст соответствующие рекомендации по приему препаратов в день УЗИ. Также, пациентам необходимо в день исследования воздержаться от курения.

Если ранее этот тип УЗДГ проводился, на прием рекомендуется взять полученные результаты.

